Medical Science Journal of Islamic Azad University Vol. 35, No. 3, Autumn 2025 ORIGINAL ARTICLE

Antibacterial activity of *Oliveria decumbens* extract on *Streptococcus mutans* and *Lactobacillus acidophylus*

Yasamin Barkian[1], Roohollah Fateh[2], Hoda Abolhasani[3], Ghazal Alavi[4], Azin Reiszadeh[5], Zahra Amouzad[1]
[1] Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran
[2] Assistant Professor, Cellular and Molecular Research Center, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran
[3] Assistant Professor of Pharmaceutical Chemistry, Department of Physiology and Pharmacology, School of Medicine, Cellular and Molecular Research Center, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran
[4] Dentistry Student, School of Dentistry, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran
[5] Dentist, School of Dentistry, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran

Abstract

Background: This study investigated the antimicrobial effects of aqueous and ethanolic extracts of *Oliveria decumbens* on *Streptococcus mutans* and *Lactobacillus acidophilus*, which are key contributors to dental caries. Considering the relative resistance of these bacteria to antibiotics and the traditional use of medicinal plants, this study was conducted to evaluate these effects.
Materials and methods: The plant extracts were prepared using the maceration method and serial dilutions. Standard bacterial strains were obtained from reliable sources and cultured in appropriate media. Aqueous and ethanolic extracts were added to bacterial suspensions in microplate wells and incubated anaerobically at 37°C for 48 hours. The minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) were determined through visual observation.
Results: The aqueous extract inhibited the growth of both bacterial species at concentrations of 2048, 1024, and 512 µg/ml, with an MIC of 512 µg/ml. Additionally, the aqueous extract exhibited bactericidal activity at concentrations of 2048 and 1024 µg/ml, with an MBC of 1024 µg/ml. On the other hand, the ethanolic extract showed no antimicrobial activity at any concentration.
Conclusion: This study demonstrates that the aqueous extract of the plant has moderate antimicrobial effects, whereas the ethanolic extract exhibited no activity.
Keywords: *Oliveria decumbens, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus mutans.*

Cited as: Barkian Y, Fateh R, Abolhasani H, Alavi Gh, Reiszadeh A, Amouzad Z. Antibacterial activity of *Oliveria decumbens* extract on *Streptococcus mutans* and *Lactobacillus acidophylus*. Medical Science Journal of Islamic Azad University, Tehran Medical Branch 2025; 35(3): **286-293.**

Correspondence to: Ghazal Alavi
Tel: *+98 991277218*
E-mail: alavighazal77@gmail.com
ORCID ID: 0009-0007-2547-5634
Received: 31 Aug 2024; **Accepted:** 26 Nov 2024

[Downloaded from tmuj.iautmu.ac.ir on 2026-11-06]
[DOR: 20.1001.1.10235922.1404.35.3.4.4]
[DOI: 10.61882/iau.35.3.286]

مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
دوره ۳۵، شماره ۳، پاییز۱۴۰۴، صفحات ۲۸۶ تا ۲۹۳

Original Article

بررسی اثر آنتی‌باکتریال عصاره گیاه الوریادکومبنز بر باکتری‌های استرپتوکوکوس موتانس و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

یاسمین برکیان[۱]، روح‌الله فاتح[۲]، هدی ابوالحسنی[۳]، غزل علوی[۴]، آذین رئیس زاده[۵]، زهرا عموزاد[۱]

[۱] استادیار گروه بیماری های دهان و دندان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
[۲] استادیار، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
[۳] استادیار شیمی دارویی، گروه فیزیولوژی- فارماکولوژی، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
[۴] دانشجوی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
[۵] دندانپزشک عمومی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

چکیده

سابقه و هدف: *این پژوهش به بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره‌های آبی و الکلی گیاه الیوریادکومبنز بر روی باکتری‌های استرپتوکوکوس موتانس و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، که از عوامل اصلی پوسیدگی دندان هستند، پرداخت. با توجه به مقاومت نسبی این باکتری‌ها به آنتی‌بیوتیک‌ها و استفاده‌های سنتی از گیاهان دارویی، این مطالعه برای بررسی این اثرات انجام شد.*

روش بررسی: *ابتدا عصاره‌های گیاه به روش خیساندن و در رقت‌های سریالی مختلف تهیه شدند. سپس باکتری‌های استاندارد از منابع معتبر تهیه و در محیط‌های مناسب کشت داده شدند. عصاره‌های آبی و الکلی در چاهک‌های میکروپلیت به سوسپانسیون باکتری‌ها اضافه شده و نمونه‌ها به مدت ۴۸ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد در شرایط بی‌هوازی نگهداری شدند. میزان حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC)و حداقل غلظت باکتری‌کشی (MBC)از طریق مشاهده چشمی تعیین شد.*

یافته‌ها: *عصاره آبی در غلظت‌های ۲۰۴۸، ۱۰۲۴ و ۵۱۲ میکروگرم بر میلی‌لیتر رشد هر دو گونه باکتری را مهار کرده و MIC آن ۵۱۲ میکروگرم بر میلی‌لیتر بود. همچنین، عصاره آبی خاصیت باکتری‌کشی در غلظت‌های ۲۰۴۸ و ۱۰۲۴ میکروگرم بر میلی‌لیتر داشت و MBC آن ۱۰۲۴ میکروگرم بر میلی‌لیتر بود. از سوی دیگر، عصاره الکلی در هیچ‌یک از غلظت‌ها اثر ضدمیکروبی نداشت.*

نتیجه‌گیری: *این مطالعه نشان می‌دهد که عصاره آبی گیاه اثر ضدمیکروبی متوسطی دارد، در حالی که عصاره الکلی هیچ تأثیری ندارد.*

واژگان کلیدی: *الیوریادکومبنز، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، استرپتوکوکوس موتانس.*

مقدمه

پوسیدگی دندانی یکی از شایع‌ترین بیماری‌های مزمن و قابل‌پیشگیری در سراسر جهان است (۱). با وجود اثرگذاری عوامل مختلف در ایجاد و پیشرفت پوسیدگی دندان، فعالیت باکتری‌های تولیدکنندهٔ اسید به‌ویژه گونه استرپتوکوکوس موتانس، اصلی‌ترین عامل ایجادکننده این عارضه محسوب می‌شوند. همچنین مطالعات متعدد نشان داده‌اند که لاکتوباسیل ها در نواحی پیشروی ضایعات پوسیده قرار داشته و احتمالاً این باکتری‌ها با پوسیدگی عاج در ارتباط هستند (۲،۳).

استفاده از گیاهان دارویی برای اهداف درمانی قرن هاست که انجام میپذیرد. در سال های اخیر استفاده از داروهای گیاهی به سبب عوارض جانبی کمتر و قابلیت درمانی زیاد برای حفظ بهداشت دهان رایج شده است (۴، ۵).

آدرس نویسنده مسئول: قم، دانشگاه علوم پزشکی قم، دانشکده دندانپزشکی، غزل علوی
(email: alavighazal77@gmail.com)
ORCID ID: 0009-0007-2547-5634
تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۳/۶/۱۰
تاریخ پذیرش مقاله: ۱۴۰۳/۹/۶

[Downloaded from tmuj.iautmu.ac.ir on 2026-11-06]
[DOR: 20.1001.1.10235922.1404.35.3.4.4]
[DOI: 10.61882/iau.35.3.286]

این گیاه اثرات دارویی، ضد باکتریایی، ضدقارچی، ضد سرطانی و آنتی‌اکسیدانی قوی دارد و در طول سال‌های گذشته برای درمان بیماری‌های مختلف استفاده شده است (۶). خصوصیات ضدمیکروبی این گیاه در برابر باکتری‌های مختلف مانند سودوموناس ائروژنز، اشیرشیا کلی، استافیلوکوک اپیدرمیس و استرپتوکوک پایوژنز و ... مورد بررسی قرار گرفته است و اثرات آنتی‌باکتریال خوبی از خود نشان داده است (۸). ازآنجایی‌که گیاه الیوریادکومبنز یک گیاه بومی، مقاوم به تشنگی، قابل‌دستیابی و قابل‌تهیه در ایران است، می‌تواند منبع باارزش آنتی‌اکسیدان و آنتی‌میکروبیال قابل‌توجه برای استفاده دارویی برای بهبود سلامت مردم باشد (۷).

در این مطالعه اثر ضد باکتریائی عصاره آبی و الکلی گیاه الیوریادکومبنز علیه دو باکتری استرپتوکوک موتانس و لاکتوباسیل اسیدوفیلوس به عنوان دو میکروارگانیسم شایع دهانی که از علل اصلی پوسیدگی‌های دندانی هستند، بررسی شد تا در صورت اثربخشی این گیاه بتوانیم در مطالعات بعدی با ساخت دهان‌شویه‌های متشکل از این گیاه و مقایسه اثر آن با دهان‌شویه‌های آنتی باکتریال استاندارد، گامی در جهت تولید دهان‌شویه‌های گیاهی و کم‌ضرر برداریم.

مواد و روشها

در این پژوهش آزمایشگاهی experimental، ابتدا دو گروه اصلی انتخاب شدند. در یک گروه باکتری Streptococcus Mutans (ATCC:35668) و در گروه دیگر باکتری Lactobacillus Acidophilus (PTCC:1643) قرار گرفتند. سپس باکتری هر یک از دو گروه در چهار غلظت آبی و الکی قرار گرفتند. با این توضیح که ابتدا عصاره‌های آبی و الکلی الیوریادکومبنز به روش خیساندن در رقت‌های سریالی ۱ به ۲ از عصاره‌ها از ۲۰۴۸ تا ۴ میکروگرم در میلی‌لیتر تهیه شدند. پس از کشت مجدد باکتری‌ها در محیط کشت، سوسپانسیون باکتری مطابق لوله ۰/۵ مک فارلند تهیه شد. سپس در هریک از چاهک‌های میکروپلیت ۹۶ خانه‌ای، ۱۰۰ میکرو لیتر از رقت‌های مختلف عصاره‌های آبی و الکلی، ۱۰۰ میکرو لیتر محیط کشت (۲×) و ۱۰۰ میکرو لیتر از سوسپانسیون باکتری با غلظت ۰/۵ مک فارلند اضافه گردید. در آخر میکروپلیت ها در جار بی‌هوازی به مدت ۴۸ ساعت در دمای ۳۷ درجه قرار داده شد و بعد از گرماگذاری، میزان MIC (Minimum Inhibitory Concentration) و MBC (Minimum Bactericidal Concentration) عصاره و محلول آنتی باکتریال مورداستفاده به طریق چشمی تعیین و گزارش شد.

تهیه سوسپانسیون باکتری: سویه‌های استاندارد باکتری‌های Streptococcus mutans(ATCC ۳۵۶۶۸ و Lactobacillus Acidophilus (PTCC ۱۶۴۳ مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران تهیه شد. از باکتری‌هایی که در پلیت کاشت داده شده بود (کشت تازه ۲۴-۴۸ ساعته) در محیط براث تلقیح شد. برای استرپتوکوکوس موتانس محیط کشت مولر هینتون براث استفاده شد و برای لاکتوباسیل اسیدوفیلوس محیط BHI براث (Brain Heart Infusion) استفاده شد و پس از آن به مدت ۴۸ ساعت در جار بی‌هوازی در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد نگهداری شد. سپس سوسپانسیون باکتری مطابق لوله ۰/۵ مک فارلند تهیه شد.

دهان‌شویهٔ آنتی‌باکتریال کلروهگزدین (۹) ۰/۲ ٪ نیز در رقت‌های ۱ به ۲ از ۱۲۸ میکروگرم بر میلی‌لیتر تا ۰/۰۶۲۵ میکروگرم بر میلی‌لیتر به عنوان Gold standard مورداستفاده قرار گرفت .

تهیهٔ عصارهٔ گیاه الوریادکومبنز: اندام هوایی گیاه که شامل گل و برگ و ساقه بود در سال ۲۰۲۲ از شهرستان کازرون استان فارس تهیه شد. برای تهیهٔ عصاره آبی و الکلی الیوریادکومبنز اندام هوایی جمع‌آوری‌شدهٔ گیاه با آسیاب پودر شد. سپس پودر گیاه توسط ترازوی دیجیتال مدل kem و دقت۰/۰۱ گرم به میزان ۱۵ گرم توزین شد. پس از قرارگرفتن پودر موردنظر در ارلن، با نسبت ۱ به ۲۰، ۳۰۰ میلی‌لیتر آب مقطر دو بار تقطیر و اتانول ۹۶ ٪ به عنوان حلال روی پودر ریخته شد تا کاملاً روی پودر را بپوشاند. سپس در ارلن با پارافین به‌دقت پوشانده و محلول‌ها برای ۴۸ ساعت روی دستگاه استیرر (stirrer) در دمای اتاق قرار گرفت. این روش عصاره‌گیری خیساندن (ماسراسیون) نام دارد (۱۰).

پس از ۴۸ ساعت محلول‌های موردنظر با استفاده از کاغذ صافی، صاف شده و محلول همگن حاصل جهت تبخیر حلال در دستگاه روتاری قرار گرفت. بعد از تبخیر قسمت اعظم حلال، جهت خشک‌شدن کامل و به‌دست‌آوردن عصارهٔ پودری از دستگاه فریز درایر به مدت ۲ ساعت استفاده شد و مواد باقیمانده در ظرف، عصارهٔ آبی و الکلی گیاه الیوریادکومبنز است که با اسپاتول تراشیده شد. با استفاده از این روش ۱/۶۵ گرم عصاره خشک آبی و ۱ گرم عصاره خشک الکلی به دست آمد.

تهیه رقت‌های سریال از عصاره گیاه الوریادکومبنز: برای تهیه رقت‌های سریال از عصاره گیاه الوریادکومبنز که حالت خشک و پودری دارد از حلال DMSO محصول شرکت مرک آلمان استفاده شد(۱۱) .برای حفظ خاصیت عصاره‌ها و استریل کردن آن‌ها از وجود هرگونه آلاینده (از قبیل باکتری‌ها و ویروس‌ها) از فیلتر سر سرنگی ۲۲ میکرونی محصول شرکت jet biofil استفاده شد. پس از آن عصاره گیاه الوریادکومبنز با رقت‌های سریالی ۱ به ۲ از ۲۰۴۸ تا ۴ میکروگرم در میلی‌لیتر تهیه شده و در چاهک‌های


[Downloaded from tmuj.iautmu.ac.ir on 2026-11-06]
[DOR: 20.1001.1.10235922.1404.35.3.4.4]
[DOI: 10.61882/iau.35.3.286]

میکروپلیت ۹۶ خانه‌ای از هر رقت، میزان ۱۰۰ میکرولیتر اضافه شد(۱۲) .همچنین از دهان‌شویهٔ آنتی‌باکتریال کلروهگزدین به عنوان کنترل مثبت استفاده شد. زیرا در همه مطالعات انجام شده، دهان شویه کلرهگزدین روی تمام باکتری های های گرم مثبت و منفی اثر باکتریواستاتیک دارد و در اکثر مطالعات مرتبط با بررسی اثر یک دهان شویه گیاهی بر باکتری های دهان به عنوان کنترل مثبت در نظر گرفته می‌شود (۹).

تهیه محیط کشت مولر هینتون براث ۲×: محیط کشت ۲× دارای غلظت دو برابر محیط کشت ساده است. برای این منظور باید نسبت آب مقطر اضافه شده به محیط کشت نصف میزان توصیه شده برای تهیه محیط کشت ساده باشد. سپس محیط کشت در دمای ۱۲۱ درجه سانتی گراد استریل و در دمای ۴ درجه سانتی گراد خنک شد.

تعیین میزان MIC (minimal inhibitory concentration):

ترکیبات مورد استفاده برای هرگونه باکتریایی: ابتدا به همه خانه‌ها ۱۰۰ میکرولیتر محیط کشت ۲× اضافه شد و به ترتیب در خانه های ۱ تا ۱۲، ۱۰۰ میکرولیتر از رقت های ۱ به ۲ تهیه شده در مرحله قبل اضافه شد. سپس درون تمام چاهک ها ۱۰۰ میکرولیتر سوسپانسیون باکتری با غلظت ۰/۵مک فارلند اضافه شد که در مجموع با توجه به دو مرتبه تکرار برای هر یک از عصاره‌ها و کلرهگزیدین و همچنین دو گونه مختلف باکتری و ۱۰ رقت عصاره‌ها، ۱۲۰ چاهک استفاده شد که به همین منظور ۲ عدد میکرو پلیت ۹۶ خانه ای مورد استفاده قرار گرفت (شکل ۱).



شکل ۱. میکروپلیت ۹۶ خانه

در نهایت میکروپلیت های حاوی باکتری استرپتوکوکوس موتانس به مدت ۴۸ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد و انکوباتور دارای ۵ درصد دی اکسید کربن (CO_2) و میکروپلیت‌های حاوی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در جار بی هوازی و به مدت ۴۸ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد گرماگذاری شدند. بعد از گرماگذاری، میزان MIC عصاره گیاه الوریادکومبنز و داروی مورد استفاده به طریق چشمی تعیین و گزارش شد. کمترین غلظتی از عصاره یا دارو که در آن رشد باکتری مشاهده نشود، به عنوان MIC آن ترکیب گزارش می‌شود (۱۳).

تعیین MBC (minimum bacterial concentration)

ترکیبات مورداستفاده برای هرگونه باکتریایی: برای اندازه گیری حداقل غلظت کشنده رشد از لوله های فاقد نشانه رشد در قسمت MIC توسط یک آنس استریل و در نزدیکی شعله برداشته و بر روی محیط جامد مولر هینتون کشت گسترش داده میشود. پس از آنکوباسیون ۲۴ ساعته در دمای ۳۷ درجه ی سانتی گراد، پلیت ها از لحاظ رشد و تشکیل کلونی بررسی شده و آخرین رقتی که توانسته۹۹/۹٪باکتری ها را بکشد به عنوان MBC در نظر گرفته می‌شود (۱۴).

کنترل مثبت و منفی محیط کشت: کنترل مثبت حاوی محیط کشت و باکتری بود که نشان دهنده این بود که محیط کشت استفاده شده سالم بود و باکتری نیز زنده است که رشد کرده و کدر شده است. کنترل منفی محیط کشت حاوی محیط کشت به همراه سرم فیزیولوژی استریل است که نباید رشد داشته باشد و نشان دهنده صحیح استریل شدن محیط کشت است.

برای اطمینان از زنده و سالم‌بودن باکتری‌ها و سالم‌بودن محیط کشت، ۱۰۰ میکرولیتر از سوسپانسیون باکتری با غلظت ۰/۵ مک فارلند که ۱۰۰ مرتبه با سرم فیزیولوژی رقیق شده بود، به ۱۰۰ میکرولیتر از محیط کشت مولر هینتون براث اضافه شد و به مدت ۴۸ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد در جار بی‌هوازی نگه‌داری شد. پس از ۴۸ ساعت، محیط کشت کاملاً آثار کدورت و رشد باکتری‌ها را در خود نشان داد که این امر نشان‌دهنده سالم و زنده‌بودن باکتری‌ها و همچنین سالم‌بودن محیط کشت است.

یافته‌ها

مطالعهٔ حاضر به بررسی اثر آنتی‌باکتریال دو گروه عصارهٔ آبی و الکلی گیاه الیوریادکومبنز بر باکتری‌های استرپتوکوکوس موتانس و لاکتوباسیل اسیدوفیلوس پرداخته است. برای این منظور محیط‌های کشت به صورت چشمی از نظر کدورت در رقت‌های مختلف بررسی شدند که نتایج آن به تفکیک برای

[Downloaded from tmuj.iautmu.ac.ir on 2026-11-06]
[DOR: 20.1001.1.10235922.1404.35.3.4.4]
[DOI: 10.61882/iau.35.3.286]

هر یک از باکتری‌های ذکر شده به شرح زیر است. لازم به ذکر است که علامت + و - به ترتیب به معنای رشد و عدم رشد باکتری است. همچنین برای کنترل منفی، غلظت‌های مختلف دهان‌شویهٔ آنتی‌باکتریال کلرهگزیدین بر باکتری‌های استرپتوکوکوس موتانس و لاکتوباسیل اسیدوفیلوس سنجیده شد که نتایج آن در ادامه آمده است.

طبق نتایج آورده شده در جدول ۱ عصارهٔ آبی گیاه الیوریادکومبنز بر باکتری‌های استرپتوکوکوس موتانس و لاکتوباسیل اسیدوفیلوس اثر یکسانی داشت و در غلظت‌های ۲۰۴۸، ۱۰۲۴ و ۵۱۲ میکروگرم بر میلی‌لیتر مانع رشد این باکتری‌ها در محیط کشت شد. همچنین در تکرار آزمایش برای اطمینان از نتایج فوق دوباره همان غلظت‌ها مانع رشد باکتری شدند.

طبق نتایج آورده شده در جدول ۲ عصارهٔ الکلی گیاه الیوریادکومبنز در هیچ‌یک از غلظت‌ها مانع رشد باکتری‌های استرپتوکوکوس موتانس و لاکتوباسیل اسیدوفیلوس نشد. سپس برای اطمینان از صحت نتایج فوق آزمایش دوباره تکرار شد که همان نتایج تأیید شدند.

برای کنترل محیط کشت، دهان‌شویهٔ کلرهگزیدین و عصاره‌های آبی و الکلی به این شیوه عمل شد:

کنترل مثبت حاوی محیط کشت و باکتری است که نشان‌دهنده این است که ۱. محیط کشت استفاده‌شده سالم است و ۲. باکتری نیز زنده است که رشد کرده و کدر شده است.

کنترل منفی محیط کشت: حاوی محیط کشت به همراه سرم فیزیولوژی استریل است که نباید رشد داشته باشد و نشان‌دهنده صحیح استریل شدن محیط کشت است.

کنترل منفی عصاره و دهان‌شویه کلرهگزیدین: حاوی محیط کشت به‌علاوه عصاره یا دهان‌شویه آنتی باکتریال کلرهگزیدین است که نباید رشد داشته باشد که نشان‌دهنده استریل بودن آن دو است.

برای اطمینان از استریل بودن عصاره‌ها و دهان‌شویه کلرهگزیدین و اطمینان از عدم آلودگی آنها با میکروارگانیسم‌های دیگر، دهان‌شویه آنتی باکتریال کلرهگزیدین و عصاره‌های آبی و الکلی به محیط کشت مولر هینتون براث اضافه‌شده و به مدت ۴۸ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد در جار بی‌هوازی نگه‌داری شد.

در محیط کشت بدون باکتری و عصاره‌ها پس از ۴۸ ساعت هیچ‌گونه کدورتی مبنی بر رشد باکتری مشاهده نشد. محیط کشت به همراه باکتری‌های استرپتوکوکوس موتانس و لاکتوباسیل اسیدوفیلوس در عدم حضور عصاره‌ها و دهان‌شویهٔ کلرهگزیدین پس از ۴۸ ساعت رشد باکتری‌ها را نشان داد و در محیط کشت به همراه عصاره‌های آبی و الکلی و کلرهگزیدین پس از ۴۸ ساعت هیچ‌گونه باکتری رشد نکرد.

بحث

در مطالعهٔ حاضر عصارهٔ آبی گیاه الیوریادکومبنز در غلظت‌های ۲۰۴۸، ۱۰۲۴ و ۵۱۲ µg/ml بر هر دو گونهٔ باکتری

جدول ۱. مقایسهٔ اثر عصارهٔ آبی الیوریادکومبنز بر باکتری‌های استرپتوکوکوس موتانس و لاکتوباسیل اسیدوفیلوس

غلظت عصاره آبی µg/ml	۲۰۴۸	۱۰۲۴	۵۱۲	۲۵۶	۱۲۸	۶۴	۳۲	۱۶	۸	۴
آبی/موتانس	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+
آبی/لاکتوباسیل	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+

جدول ۲. مقایسهٔ اثر عصارهٔ الکلی الیوریادکومبنز بر باکتری‌های استرپتوکوکوس موتانس و لاکتوباسیل اسیدوفیلوس

غلظت عصاره الکلی µg/ml	۲۰۴۸	۱۰۲۴	۵۱۲	۲۵۶	۱۲۸	۶۴	۳۲	۱۶	۸	۴
الکلی /موتانس	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
الکلی/ لاکتوباسیل	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

جدول ۳. کنترل محیط کشت، باکتری و عصاره ها

کنترل	مولر خالی	مولر/لاکتوباسیل	مولر/کلرهگزیدین	مولر/الکلی	مولر/آبی	مولر/موتانس
نتایج کنترل	-	+	-	-	-	+

[Downloaded from tmuj.iautmu.ac.ir on 2026-11-06]
[DOR: 20.1001.1.10235922.1404.35.3.4.4]
[DOI: 10.61882/iau.35.3.286]

استرپتوکوکوس موتانس و لاکتوباسیل اسیدوفیلوس اثر ضدباکتریایی داشته و عصارهٔ الکلی در هیچ‌کدام از غلظت‌ها مانع رشد باکتری‌ها نشد.

علیزاده و همکارانش در مطالعه‌ای به بررسی اثر عصارهٔ گیاه الیوریادکومبنز بر ۲ نوع باکتری باسیل گرم منفی Pseudomonas aeruginosa، Escherichia coli و ۲ نوع کوکسی گرم مثبت Staphylococcus epidermidis و Streptococcus pyogenes پرداختند (۸). طبق نتایج، عصارهٔ آبی گیاه الیوریادکومبنز بیشترین اثر بازدارندگی رشد را به ترتیب بر باکتری‌های Streptococcus pyogenes، Staphylococcus epidermidis، Escherichia coli و Pseudomonas aeruginosa داشت. همچنین در همهٔ غلظت‌ها بر کوکسی‌های گرم مثبت هالهٔ عدم رشد را ایجاد کرده بود. بر اساس نتایج این مطالعه می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که عصارهٔ آبی الیوریادکومبنز بیشترین اثر بازدارندگی را بر باکتری‌های گرم مثبت داشته است که با نتایج مطالعهٔ حاضر ازاین‌جهت هم سو است؛ زیرا در مطالعهٔ حاضر باکتری استرپتوکوک موتانس که با استرپتوکوک پایوژنز در یک سرده قرار می‌گیرند و باکتری لاکتوباسیل اسیدوفیلوس که باسیل گرم مثبت است، حضور دارند و علی‌رغم استفاده از غلظت‌های کمتر، عصارهٔ آبی گیاه اثر بازدارندگی رشد بر باکتری‌ها داشته است.

حاجی مهدی‌پور و همکارانش در مطالعه‌ای به بررسی اثر آنتی‌باکتریال عصارهٔ گیاه الیوریادکومبنز بر ۳ نوع باکتری گرم مثبت، ۲ نوع گرم منفی و ۲ نوع قارچ پرداختند (۱۵). طبق نتایج این پژوهش، عصارهٔ گیاه الیوریادکومبنز اثر آنتی‌باکتریال قوی علیه باکتری‌های گرم مثبت Staphylococcus aureus، methicillin-resistant Staphylococcus aureus، Bacillus subtilis، باکتری گرم منفی Escherichia coli، قارچ‌های Aspergillus niger وCandida albicans و اثر آنتی‌باکتریال ضعیفی علیه باکتری گرم منفی Pseudomonas aeroginosa داشت. نتایج این مطالعه هم سو با مطالعهٔ حاضر است؛ زیرا باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس و استرپتوکوک موتانس در یک سرده و باسیلوس ساب تایلیس و لاکتوباسیل اسیدوفیلوس در یک راسته قرار دارند؛ اما علت داشتن اثر آنتی‌باکتریال در این غلظت‌های بسیار اندک می‌تواند مرتبط به محل جمع‌آوری گیاه و نحوهٔ عصاره‌گیری و روش بررسی اثر آنتی‌باکتریال باشد که از این جهت با مطالعهٔ حاضر متفاوت است.

معتمدی و همکارانش در مطالعه‌ای به بررسی اثر آنتی‌باکتریال عصارهٔ اتانولی و متانولی گیاهان اسفرزه و الیوریادکومبنز بر ۶ نوع باکتری گرم منفی و ۸ نوع باکتری گرم مثبت پرداختند (۱۶). نتایج نشان داد که عصارهٔ اتانولی و متانولی هر دو گیاه اثر آنتی‌باکتریال خوبی علیه هر دو گروه باکتری گرم مثبت و گرم منفی دارد. عصارهٔ اتانولی الیوریادکومبنز فعالیت آنتی‌باکتریال علیه همهٔ باکتری‌های تست‌شده دارد و باکتری Staphylococcus aureus که کوکسی گرم مثبت است، بیشترین حساسیت را به عصارهٔ اتانولی دارد و عصارهٔ متانولی این گیاه نیز فعالیت آنتی‌باکتریال علیه اکثر گونه‌های باکتریایی دارد. در این مطالعه برخلاف مطالعهٔ حاضر، عصارهٔ الکلی گیاه الیوریادکومبنز بر باکتری‌ها مؤثر بود، هرچند نوع باکتری متفاوت است. علت تفاوت در نتایج این مطالعه با مطالعهٔ حاضر تفاوت در نوع باکتری، نسبت گیاه به حلال، غلظت‌های تهیه‌شده از عصاره‌ها و محل جمع‌آوری گیاه است؛ زیرا نسبت گیاه به حلال این مطالعه دو برابر نسبت گیاه به حلال استفاده‌شده در مطالعهٔ حاضر بود و غلظت‌های تهیه‌شده از عصاره‌های اتانولی و متانولی، بسیار بیشتر از غلظت‌های تهیه‌شده از عصارهٔ آبی و الکلی مطالعهٔ حاضر بودند.

محبوبی و همکارانش اثر اسانس آبی الیوریادکومبنز را بر ۶ نوع باکتری گرم مثبت، ۹ نوع گرم منفی و ۳ نوع قارچ بررسی کردند (۱۷). بر اساس نتایج، اسانس الیوریادکومبنز بیشترین اثر مهاری را به ترتیب بر قارچ‌ها، باکتری‌های گرم مثبت و سپس باکتری‌های گرم منفی دارد و بر باکتری‌های تشکیل‌دهندهٔ اسپور بی‌اثر است. در بین قارچ‌ها قارچ آسپرژیلوس نایجر و در باکتری‌های گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس و در باکتری‌های گرم منفی کلبسیلا پنومونیا بیشترین هاله عدم رشد را داشتند. ازآنجا که اسانس آبی این گیاه روی کوکسی های گرم مثبت اثر آنتی‌باکتریال داشته است، نتایج آن بامطالعهٔ حاضر هم سو است. گرچه غلظت‌های مورداستفاده در این مطالعه از غلظت‌های مطالعهٔ حاضر کمتر است که علت اثربخشی آن را می‌توان در تفاوت اسانس و عصاره و روش استخراج مواد مؤثرهٔ گیاه و همچنین تفاوت روش ارزیابی خاصیت ضدمیکروبی در دو مطالعه دانست.

بر اساس نتایج مطالعهٔ امین و همکارانش عصارهٔ گیاه الیوریادکومبنز اثر آنتی‌میکروبیال گسترده‌ای علیه باکتری‌های E.coli,P.aeruginosa,S.marcescens,S.aureus,S.epidermid is, B.cereus و قارچ‌های A.niger, C.albicans نشان داد (۱۸). میزان حساسیت باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی

[Downloaded from tmuj.iautmu.ac.ir on 2026-11-06]
[DOR: 20.1001.1.10235922.1404.35.3.4.4]
[DOI: 10.61882/iau.35.3.286]

نسبت به عصارهٔ حاصل از گل‌های گیاه در این مطالعه برابر بود که می‌تواند به دلیل میزان بسیار بالای کارواکرول در گل‌های این گیاه باشد. باتوجه‌به اثرگذاری عصارهٔ گیاه بر کوکسی‌های گرم مثبت استافیلوکوک اپیدرمیدیس و استافیلوکوک اورئوس و باسیل گرم مثبت باسیلوس سرئوس و مشابهت این باکتری‌ها با باکتری‌های مطالعهٔ حاضر، نتایج این مطالعه با مطالعهٔ حاضر هم سو است.

بر اساس مطالعهٔ فهیم و همکارانش رشد باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی با میزان قطر هالهٔ عدم رشد به ترتیب ۱۲/۵ میلی‌متر و ۸/۷۵ میلی‌متر به طور مؤثری توسط اسانس الیوریادکومبنز محدود می‌شود که نشان‌دهنده حساسیت بیشتر باکتری‌های گرم مثبت نسبت به گرم منفی به این اسانس است (۱۹). باتوجه‌به این که در این مطالعه در مورد نوع و نحوهٔ تهیه عصاره و محل تهیه و اندام مورداستفادهٔ گیاه توضیحی داده نشده، به نظر می‌آید با مطالعهٔ حاضر متفاوت باشد، همچنان که روش ارزیابی خاصیت ضدمیکروبی که دیسک دیفیوژن است، با مطالعهٔ حاضر که میکروبراث دایلوشن است تفاوت دارد.

بر اساس یافته‌های مطالعه حاضرنتیجه‌گیری می‌شود، عصارهٔ الکلی گیاه الیوریادکومبنز در هیچ یک از غلظت‌ها بر باکتری‌های استرپتوکوکوس موتانس و لاکتوباسیل اسیدوفیلوس اثر مهاری ندارد؛ ولی عصاره آبی در غلظت‌های ۲۰۴۸، ۱۰۲۴ و ۵۱۲ میکروگرم بر میلی‌لیتر مانع از رشد هر دو باکتری می‌شود که می‌توان این گونه نتیجه گرفت که حلال آب از استخراج مواد مؤثرهٔ الیوریادکومبنز نسبت به اتانول بهتر عمل می‌کند. ازآنجاکه عصاره آبی این گیاه تنها در ۳ غلظت اول اثر مهارکنندگی رشد از خود نشان داد، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که گیاه الیوریادکومبنز در مقایسه با دهان‌شویهٔ کلرهگزیدین دارای اثر آنتی‌باکتریال ضعیف‌تری است.

REFERENCES

1. Obregón-Rodríguez N, Fernández-Riveiro P, Piñeiro-Lamas M, Smyth-Chamosa E, Montes-Martínez A, Suárez-Cunqueiro MM. Prevalence and caries-related risk factors in schoolchildren of 12- and 15-year-old: a cross-sectional study. BMC Oral Health 2019;19:120.

2.Forssten SD, Björklund M, Ouwehand AC. Streptococcus mutans, caries and simulation models. Nutrients 2010;2:290-8.

3. Matsumoto-Nakano M. Role of Streptococcus mutans surface proteins for biofilm formation. Jpn Dent Sci Rev 2017;54:22–29.

4.Sadeghi M, Bahramabadi R, Asar S. Antibacterial Effects of Persica and Matrica Herbal Mouthwashes on Common Oral Microorganisms: An In Vitro Study. Journal of Mashhad Dental School 2011;35:107-14. [In Persian]

5. Anyanwu MU, Okoye RC. Antimicrobial activity of Nigerian medicinal plants. J Intercult Ethnopharmacol 2017;6:240–59.

6. Mollaei S, Mamizadeh Z, Hazrati S, Hashempour H. The effect of ultrasonic pre-treatment on the yield, chemical composition and biological activity of essential oil in Oliveria decumbens flowers. Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants 2021;24:100313.

7.Esmaeili H, Karami A, Maggi F. Essential oil composition, total phenolic and flavonoids contents, and antioxidant activity of Oliveria decumbens Vent. (Apiaceae) at different phenological stages. Journal of Cleaner Production 2018;198:91-5.

8.Alizadeh Behbahani B, Tabatabaei Yazdi F, Vasiee A, Mortazavi SA. Oliveria decumbens essential oil: Chemical compositions and antimicrobial activity against the growth of some clinical and standard strains causing infection. Microb Pathog 2018;114:449-52.

9.Bernardes WA, Lucarini R, Tozatti MG, Souza MG, Silva ML, Filho AA, et al. Antimicrobial activity of Rosmarinus officinalis against oral pathogens: relevance of carnosic acid and carnosol. CheBiodivers 2010;7:1835-40.

10.Enayati N, Ghafarzadegan R, Hajiaghaee R, Vazirian M. comparison of differnt extraction methods for the extraction of bioactive components of Senna alexandrina. Journal of Medicinal Plants 2017;16:160-9.

11.Rezaie Keikhaie K, Ghorbani S, Hosseinzadeh Z, Hassanshahian M. Antimicrobial activity of methanol extract of Citrullus colocynthis against antibiotic-resistant Staphylococcus aureus. Future Natural Products 2018;4:64-72.

12. Rahmy RA, Abdel El Hamid DH, Fahim NA. Evaluation of broth disk elution test and agar test to determine colistin in vitro activity in Enterobacteriaceae. Ain Shams Med J 2024;75:1–10.

13.Benkova M, Soukup O, Marek J. Antimicrobial susceptibility testing: currently used methods and devices and the near future in clinical practice. J Appl Microbiol 2020;129:806-22.

[Downloaded from tmuj.iautmu.ac.ir on 2026-11-06]
[DOR: 20.1001.1.10235922.1404.35.3.4.4]
[DOI: 10.61882/iau.35.3.286]

14.Soltan Dallal M, Yazdi M, Aghaamiri S, Haghighat Khajavi S, Abedi Mohtasab T, Amin Harati F, et al. Antimicrobial Effect of Zataria multiflora and Rosemarinus officinalis on Antibiotic-resistant Staphylococcus aureus Strains Isolated from Food. Journal of Medicinal Plants. 2014;13:41-7.

15.Hajimehdipoor H, Samadi N, Mozaffarian V, Rahimifard N, Shoeibi S, Pirali Hamedani M. Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Oliveria decumbens Volatile Oil from West of Iran. Journal of Medicinal Plants 2010;9:39-44.

16. Motamedi H, Darabpour E, Gholipour-Shahraki M, Seyyed Nejad SM. Antibacterial effect of ethanolic and methanolic extracts of Plantago ovata and Oliveria decumbens endemic in Iran against some pathogenic bacteria. Int J Pharmacol 2010;6:117–22.

17.Mahboubi M, Feizabadi MM, Haghi G, Hosseini H. Antimicrobial activity and chemical composition of essential oil from Oliveria decumbens Vent. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research 2008;24:56-65. [In Persian]

18.Amin G, Sourmaghi MH, Zahedi M, Khanavi M, Samadi N. Essential oil composition and antimicrobial activity of Oliveria decumbens. Fitoterapia 2005;76:704-7.

19.Abbasi H, FAHIM H, Mahboubi M, Tahmasbi N. Antibacterial properties and stability of emulsions containing Cuminum cyminum and Oliveria decumbens Vent. essential oils prepared by ultrasound. Journal of Food Science and Technology (FSCT) 2019;16:41-51. [In Persian]

[Downloaded from tmuj.iautmu.ac.ir on 2026-11-06]

[DOR: 20.1001.1.10235922.1404.35.3.4.4]

[DOI: 10.61882/iau.35.3.286]