

Nurses' clinical competence in psychiatric wards of selected hospital of University of Behzisti & Tavanbakhshi, 2018-2019

Mohammad Hossein Karaminia¹, Samaneh Parchebehafieh², Sedigheh Maleki³, Aref Amirkhani⁴

¹ Psychiatrist Nurse, Besat Hospital, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

² Department of Nursing, Instructor, School of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University of Medical Sciences, Tehran, Iran

³ Department of Nursing, Instructor, School of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University of Medical Sciences, Tehran, Iran

⁴ Associate Professor, Department of Epidemiology and Statistics, School of Medicine, Islamic Azad University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Abstract

Background: Clinical competence in nursing profession has a unique position. The quality of care in the psychiatric wards, which include patients with special conditions, is important. Hence, nurses of these departments must have high clinical competency. The aim of this study was to determine the clinical competency of nurses working in psychiatric wards.

Materials and methods: In this descriptive cross-sectional study, 210 nurses working in psychiatric wards of selected hospitals of the University of Behzisti and Tavanbakhshi Sciences were selected by simple random sampling. After completing the demographic questionnaire, clinical function of nurses was assessed by a checklist of clinical competence scale in CCMHN psychiatric nurses. For data analysis, descriptive and inferential statistics were used in SPSS 21 software.

Results: Clinical competence was in a good level among 70.9% of clinical nurses. There was a significant association between work experience and clinical competency, work shift, and clinical competency, and overtime and clinical competence ($p<0.05$).

Conclusion: The results showed that the clinical competence of the nurses is desirable and there is a need for planning for its development. However, the need to plan work hours and avoid overtime in nurses, as well as the appropriate distribution of personnel based on work experience and constant staff shift can help to balance and improve the clinical competence of nurses.

Keywords: Clinical competency, Psychiatric nurses, Psychiatric wards.

Cited as: Karaminia MH, Parchebehafieh S, Maleki S, Amirkhani A. Nurses' clinical competence in psychiatric wards of selected hospital of University of Behzisti & Tavanbakhshi, 2018-2019. Medical Science Journal of Islamic Azad University, Tehran Medical Branch 2020; 30(3): 332-340.

Correspondence to: Samaneh Parchebehafieh

Tel: +98 9122543795

E-mail: s.parchebehaf@iautm.ac.ir

ORCID ID: 0000-0003-2307-579

Received: 22 June 2019; **Accepted:** 17 Sep 2019

شاپرستگی بالینی پرستاران شاغل در بخش‌های اعصاب و روان بیمارستان منتخب دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸

محمد حسین کرمی نیا^۱، سمانه پارچه بافیه^۲، صدیقه ملکی^۲، عارف امیرخانی^۳

^۱ کارشناس ارشد روانپرستاری، بیمارستان بعثت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

^۲ مری گروه پرستاری، واحد علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

^۳ دانشیار گروه اپیدمیولوژی و آمار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، تهران

چکیده

سابقه و هدف: شاپرستگی بالینی در حرفه پرستاری از جایگاهی منحصر به فرد برخوردار است. کیفیت مراقبت در بخش‌های اعصاب و روان که شامل بیمارانی با شرایط ویژه هستند حائز اهمیت است. از این رو پرستاران این بخش‌ها باید از شاپرستگی بالینی بالایی برخوردار باشند. این مطالعه با هدف تعیین شاپرستگی بالینی پرستاران شاغل در بخش‌های اعصاب و روان انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه توصیفی مقطعی، ۲۱۰ پرستار شاغل در بخش‌های اعصاب و روان بیمارستان منتخب دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. پس از تکمیل پرسشنامه جمعیت شناختی، عملکرد بالینی پرستاران توسط چک لیست مقیاس شاپرستگی بالینی در پرستاران روانپزشکی CCMHN مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استباطی در نرم افزار SPSS نسخه ۲۱ استفاده شد.

یافته‌ها: ۷۰/۹ درصد از پرستاران شاپرستگی بالینی در سطح خوب داشتند. بین ساقه کار و شاپرستگی بالینی، نوبت کاری و شاپرستگی بالینی و اضافه کار و شاپرستگی بالینی ارتباط معنی‌داری وجود داشت ($p < 0.05$).

نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که شاپرستگی بالینی واحدهای پژوهش در حد مطلوبی است و نیاز به برنامه ریزی به منظور توسعه آن وجود دارد. اما برنامه ریزی صحیح ساعت کاری و اجتناب از اضافه کاری در پرستاران، همچنین توزیع مناسب پرسنل بر اساس ساقه کاری و ثابت بودن شیفت‌های کاری پرسنل می‌تواند به ایجاد توازن و بهبود شاپرستگی بالینی پرستاران کمک کند.

وازگان کلیدی: شاپرستگی بالینی، پرستاران روانپزشکی، بخش‌های اعصاب و روان.

پرستاری و مفهوم کیفیت مراقبت سبب شده شاپرستگی در حرفه پرستاری به عنوان رشته‌ای عملی، از جایگاهی منحصر به فرد برخوردار باشد (۱). تعاریف مختلفی از شاپرستگی بالینی وجود دارد، اما در حیطه روان پرستاری تعریف مشخصی ارائه نشده است (۲).

از دیدگاه مدیریت، شاپرستگی بالینی پرستاری عامل موثری در تضمین کیفیت خدمات مراقبتی ارائه شده به بیماران و کسب رضایت آنهاست (۳). با افزایش شاپرستگی بالینی پرستار، کیفیت خدمات پرستاری ارتقا یافته و این امر منجر به افزایش رضایت

مقدمه

از مهم‌ترین حوزه‌های توسعه پایدار سلامتی در جوامع بشری، بخش بهداشت و درمان است که ارتباط مستقیمی با سلامت انسان‌ها دارد و وظیفه خطیر حفظ و اعاده سلامتی به جامعه انسانی را عهده‌دار است (۱). ارتباط نزدیک بین شاپرستگی

آدرس نویسنده مسئول: تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه‌دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده پرستاری و مامایی، سمانه پارچه بافیه (email: parchebafieh_s@yahoo.com)

ORCID ID: 0000-0003-2307-5779

تاریخ دریافت مقاله: ۹۷/۴/۱

تاریخ پذیرش مقاله: ۹۷/۶/۲۶

برای ارائه مراقبت‌های کیفی مناسب، حرفه‌ای و استاندارد نیازمند شایستگی بالینی باشند.^(۳) شایستگی و مهارت‌های اختصاصی روان پرستاران تفاوت‌های عمده‌ای با سایر حیطه‌های پرستاری دارد، چرا که عملکرد پرستاران در بخش‌های روانپزشکی نشان دهنده ارائه مراقبت برای بیمارانی است که در اصطلاح، اختلال و عملکرد آنها پیچیده و چالش‌زا است. بیماران پذیرش شده در این بخش‌ها از جمله شدیدترین بیماری‌ها هستند.^(۱۷) طبق مطالعات، بیش از نیمی از پرستاران شاغل در بخش‌های روانپزشکی، تحت فشارهای روانی و استرسورهای شغلی زیادی هستند.^(۱۸) این در حالی است که این استرسورها می‌توانند بر شایستگی بالینی آنها اثر بگذارد؛ بنابراین شایستگی بالینی این پرستاران دستخوش عوامل شغلی و محیطی قرار می‌گیرد.^(۱۹) با اینکه پرستاران نقش اساسی در ارائه مراقبت‌های درمانی در بیمارستان‌ها و به خصوص بخش‌های روانپزشکی ایفا می‌کنند، متاسفانه اطلاعات ما درباره وضعیت شایستگی بالینی و میزان به کارگیری مهارت‌های پرستاری توسط روان پرستاران بسیار اندک است. این فقدان اطلاعات کافی در خصوص شایستگی بالینی پرستاران شاغل در بخش‌های اعصاب و روان در ایران می‌تواند تبعات ناگواری ایجاد کند؛ از این رو بررسی شایستگی بالینی پرستاران بخش‌های روان پزشکی، می‌تواند برآیندی از واقعیت‌ها و شکاف موجود و معیاری برای شناخت دقیق‌تر کاستی‌ها و در مرحله بعد، رفع این کاستی‌ها باشد. علاوه بر این، از آنجا که به کارگیری ابزارهای سنجش شایستگی بالینی روان پرستاران عرصه نسبتاً جدیدی از مطالعه است، انجام مطالعات گسترش‌تر در این زمینه اجتناب ناپذیر است. با وجود اهمیت موضوع، پژوهشگران بر آن شدنند که این مطالعه را به هدف تعیین شایستگی بالینی پرستاران شاغل در بخش‌های اعصاب و روان بیمارستان منتخب دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انجام شد. به این منظور، ۲۱۰ پرستار به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابتدا کل بخش‌های بیمارستان دسته بنده شدند، سپس از بین بخش‌ها متناسب با تعداد پرستاران، نمونه‌ها به صورت تصادفی برگزیده شدند. معیارهای ورود شامل سابقه کار بالینی در بخش‌های اعصاب و روان به مدت حداقل ۶ ماه، تمایل به شرکت در پژوهش، و مدرک کارشناسی و بالاتر بود. در صورتی

بیماران می‌شود^(۵). لذا سیستم خدمات بهداشتی می‌تواند با ارتقا شایستگی بالینی پرستاران یا به کارگیری پرستاران با شایستگی بیشتر، رضایت مددجویان را فراهم سازد.^(۶) آموزش پرستار باید با نیازهای شایستگی محیط در حال تغییر در مراقبت‌های بهداشتی هماهنگ باشد.^(۷) داشتن پرستاران رشد یافته و شایسته و ماندگاری آنها در سیستم برای ارائه خدماتی با کیفیت و ایمن ضروری است.^(۸) سازمان برای رسیدن به اهداف خود به نیروی متعهد و شایسته نیاز دارد که تنها با به روز کردن و ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان مهیا می‌شود.^(۹) از این رو ارزیابی شایستگی بالینی بسیار ضروری است؛ چرا که مراقبت‌های پرستاری شایسته منجر به افزایش ایمنی، ارتقاء سطح مراقبت‌ها و جلوگیری از خطاهای پزشکی مانند اشتباهات دارویی، عفونت‌های بیمارستانی و مرگ و میر می‌شود.^(۱۰) به کارگیری معیارهای سنجش شایستگی، نه تنها به شناخت و آگاهی بیشتر پرستاران و مدیران نسبت به میزان شایستگی آنان می‌انجامد، بلکه کمبودها و نقص‌های مهارتی و شناختی را نیز در آنها مشخص می‌سازد.^(۱۱، ۱۲)

مطالعات مختلفی در داخل و خارج از کشور به ارزیابی شایستگی بالینی پرستاران پرداخته‌اند. کمیلی ثانی و همکارانش در سال ۲۰۱۴ مطالعه‌ای در رابطه با بررسی شایستگی بالینی پرستاران انجام دادند. نتایج نشان داد ۲۶ درصد از پرستاران مورد مطالعه در سطح متوسط و ۳ درصد در سطح ضعیف شایستگی بالینی قرار داشتند.^(۱) در مطالعه‌ای که توسط کوانگ و سوشان در سال ۲۰۱۷ انجام شد، تنها ۲۳ درصد از پرستاران تازه فارغ التحصیل در سطح قابل قبولی از شایستگی بالینی اولیه قرار داشتند.^(۱۳) در مطالعه‌ای که توسط سرگازی و همکارانش در سال ۲۰۱۸ انجام شد، نتایج نشان دادند که تأثیر آموزش استقامتی استرس (stress inoculation training) در شایستگی بالینی پرستاران روانپزشکی منجر به افزایش قابل توجهی در میانگین نمره کلی ابعاد شایستگی بالینی به خصوص در ابعاد ارتباط و مراقبت‌های بالینی می‌شود.^(۱۴) در مطالعه وثوقی و همکارانش، ۴۰/۷ درصد از پرستاران در سطح متوسط و ۱۱/۱ درصد در سطح ضعیف شایستگی بالینی ارزیابی شدند و همچنین شایستگی بالینی پرستاران مورد مطالعه در حیطه‌های پیشرفت و تکامل حرفه‌ای و مدیریت و رهبری مناسب نبود.^(۱۵) حاجی باقری و اشرانی در مطالعه‌شان نشان دادند که رابطه مثبتی بین شایستگی بالینی پرستاران و میزان به کارگیری این شایستگی‌ها در پرستاران وجود دارد.^(۱۶)

گسترده‌گی اختلالات روانی باعث شده پرستاران، به ویژه پرستاران بخش‌های اعصاب و روان، به عنوان اصلی‌ترین مراقبان تیم درمان

مواد و روشها

این مطالعه توصیفی- مقطعی است در تمام بخش‌های اعصاب و روان بیمارستان منتخب دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انجام شد. به این منظور، ۲۱۰ پرستار به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابتدا کل بخش‌های بیمارستان دسته بنده شدند، سپس از بین بخش‌ها متناسب با تعداد پرستاران، نمونه‌ها به صورت تصادفی برگزیده شدند. معیارهای ورود شامل سابقه کار بالینی در پژوهش، و مدرک کارشناسی و بالاتر بود. در صورتی

کمیته اخلاق به شماره IR.IAU.TMU.REC.1397.003 علوم پژوهشی آزاد اسلامی تهران به تصویب رسید. به منظور تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS نسخه ۲۱ استفاده شد. از روش‌های آماری توصیفی (جدول و ساخته‌های عددی، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آتالیز رگرسیون چند جمله‌ای) استفاده شد. از میانگین و انحراف معیار به منظور توصیف متغیرهای دموگرافیک و شایستگی بالینی، از درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار برای توصیف حیطه‌های شایستگی بالینی و به منظور تعیین ارتباط بین متغیرها از آزمون رگرسیون چند جمله‌ای و دوربین واتسن استفاده شد. در همه موارد سطح معنی‌داری کمتر از ۰/۰۵ تعیین شد.

یافته‌ها

تعداد ۲۱۰ پرسشنامه و چک لیست به طور کامل تکمیل شد. مشخصات دموگرافیک واحدهای پژوهش در جدول ۱ به اختصار بیان شده است.

همان طور که در جدول ۲ مشاهده می‌شود، اکثر (۷۰/۹٪) پرستاران تحت مطالعه دارای شایستگی بالینی خوب، تعداد ۳۱ پرستار (۱۴/۷٪) در رده شایستگی بالینی عالی و ۲۵ پرستار (۱۱/۹٪) در رده شایستگی بالینی متوسط و ۲/۳٪ در رده شایستگی بالینی ضعیف قرار داشتند. شایستگی بالینی واحدهای پژوهش در بعد اخلاقی - عاطفی دارای میانگین و انحراف معیار میانگین ۴۸±۶/۱۸ امتیاز، در بعد شایستگی در برقراری ارتباط درمانی دارای میانگین و انحراف معیار ۹/۴±۵/۱۶ امتیاز و شایستگی بالینی در بعد مراقبت‌های ویژه در پرستاران مورد مطالعه دارای میانگین و انحراف معیار ۳۰/۱۱±۱۱/۵۹ امتیاز بود.

در حیطه شایستگی اخلاقی-عاطفی اکثر پرستاران (۶۲/۸٪) در سطح خوب بودند. ۲۱/۴ درصد از پرستاران در سطح عالی، ۱۴/۳ درصد از پرستاران سطح متوسط و تنها ۱/۴ درصد از پرستاران در این بعد در سطح ضعیف قرار داشتند. در حیطه شایستگی ارتباط درمانی اکثر (۵۲/۳٪) پرستاران تحت مطالعه در سطح خوب بودند. ۱۲/۸ درصد از پرستاران در سطح عالی، ۳۰/۹ درصد از پرستاران سطح متوسط و ۳/۸ درصد از پرستاران در این بعد در سطح ضعیف قرار داشتند. در حیطه شایستگی مراقبت‌های ویژه نیز اکثر (۷۱/۴٪) پرستاران تحت مطالعه در سطح خوب بودند. ۱۸/۱ درصد از پرستاران در سطح عالی، ۹/۵ درصد از

که نمونه‌ها پست‌های مدیریتی و سرپرستی در بیمارستان داشتند از پژوهش خارج می‌شدند.

ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک (سن، جنس، وضعیت تاہل، مقطع تحصیلی، داشتن فرزند، نوبت کاری، سابقه کار، سابقه کار در بخش اعصاب و روان و اضافه کار) و چک لیست مقیاس شایستگی بالینی در پرستاران روانپزشکی Clinical Competency of Mental Health (CCMHN Nursing)، که به وسیله مسکوبی و همکارانش (۱۸) طراحی و روانسنجی شده است، بود. چک لیست مشاهدهای مربوط به ارزیابی شایستگی بالینی پرستاران که شامل ۴۵ سوال و دارای سه حیطه است، مورد استفاده قرار گرفت. این ابعاد شامل حیطه‌های "شایستگی‌های اخلاقی-عاطفی" (۱۲ عبارت)، "شایستگی‌های برقراری ارتباط درمانی" (۱۰ عبارت) و "شایستگی‌های مراقبت اختصاصی" (۱۰ عبارت) بود. در این ابزار برای نمره‌دهی به هر شایستگی (عبارت)، مقیاس لیکرت پنج گزینه‌ای در نظر گرفته شده و برای هر سوال، نمره ای از صفر (گزینه هیچ وقت) تا ۴ (گزینه همیشه) در نظر گرفته شد. چهار سطح شایستگی به صورت، عالی (نمره بین ۱۸۰-۱۳۶)، خوب (نمره بین ۱۳۵-۹۱)، متوسط (نمره بین ۹۰-۴۶) و ضعیف (نمره کمتر از ۴۶) دسته بندی شدند. روایی و پایایی این ابزار توسط مسکوبی و همکاران تایید شده است. در مطالعه حاضر پایایی ابزار از طریق بازآزمایی بررسی شد؛ به این ترتیب که ابتدا تعداد ۱۰ نفر پرستار شاغل در بخش روانپزشکی که از مطالعه حذف شدند را به صورت تصادفی انتخاب و سپس مقیاس شایستگی بالینی در پرستاران روانپزشکی CCMHN، برای دو بار و در فاصله ده روز توسط پژوهشگر برای این افراد تکمیل شد. آنگاه ضریب آزمون آلفای کرونباخ نتایج مرحله اول و دوم مورد محاسبه قرار گرفت. قابلیت اطمینان ابزار توسط آلفای کرونباخ از طریق سازگاری داخلی برای کل ابزار، ۰/۹۷ محاسبه شد که نشان دهنده پایایی مناسب ابزار است.

روش کار بدین صورت بود که پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی توسط واحدهای پژوهش تکمیل شد. سپس پژوهشگر که در مورد ابزار گردآوری داده‌ها آموزش دیده بود عملکرد پرستاران را در طول شیفت کاری مورد مشاهده قرار داد و عملکرد آنها را در چک لیست مقیاس شایستگی بالینی ثبت کرد. از جمله ملاحظات اخلاقی این پژوهش، ارائه توضیحات لازم در مورد اهداف پژوهش به پرستاران و در صورت تمایل به شرکت در مطالعه اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه، عدم نیاز به درج نام و نام خانوادگی و محرمانه بودن اطلاعات فردی بود. این مطالعه توسط شورای پژوهش و تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری-مامایی و

جدول ۱. متغیرهای جمعیت شناختی پرستاران

متغیر	مورد	فراوانی	درصد	میانگین	انحراف معیار
جنسیت	مرد	۱۲۶	۶۰	-	-
زن		۸۴	۴۰	-	-
تاهل	مجرد	۷۳	۳۴/۸	-	-
متاهل		۱۳۷	۶۵/۲	-	-
تعداد فرزند	بدون فرزند	۹۹	۴۷/۱	-	-
یک		۶۴	۳۰/۵	-	-
دو		۲۲	۱۰/۴	-	-
سه و بیشتر		۲۵	۱۱/۹	-	-
تحصیلات	لیسانس	۲۰۴	۹۷/۱	-	-
فوق لیسانس و بالاتر		۶	۲/۹	-	-
نوبت کاری	صبح	۳۷	۱۷/۶	-	-
عصر		۵	۲/۴	-	-
شب		۲۸	۱۳/۳	-	-
در چرخش		۱۲۸	۶۱	-	-
دو شیفت		۱۲	۵/۷	-	-
سن	سال	-	-	۳۳/۳۳	۶/۷۵ ±
سال		-	-	۱۰/۴۰	۷/۰۱ ±
سابقه کاری بخش اعصاب و روان		-	-	۷/۱۷	۴/۱۱ ±
اضافه کار(ساعت در ماه)		-	-	۱۰۱/۴۵	۴۹/۳۹ ±

اضافه کار، میانگین شاپرستگی اخلاقی/عاطفی ۳/۴ کاهش معنی‌داری می‌یابد. همچنین ارتباط نوبت کاری با شاپرستگی بالینی نمونه‌ها معنی‌دار بود؛ به طوری که پرستارانی که در نوبت کاری صبح فعالیت می‌کردند به طور معنی‌داری شاپرستگی بالینی بیشتری نسبت به پرستاران شاغل در نوبت کاری در چرخش داشتند ($p < 0.05$).

در بررسی ارتباط مشخصات دموگرافیک با بعد ارتباط درمانی شاپرستگی، نتایج نشان داد با افزایش هر سال سابقه کار، میانگین بعد ارتباط درمانی شاپرستگی بالینی ۲/۶۴ افزایش معنی‌دار می‌یابد ($p < 0.05$). ارتباط نوبت کاری در شاپرستگی بالینی نیز معنی‌دار بود، به طوری که در نوبت کاری صبح، شاپرستگی بالینی بیشتر از نوبت کاری در چرخش بود ($p < 0.05$).

در بررسی ارتباط مشخصات دموگرافیک با بعد مراقبت‌های ویژه شاپرستگی، تنها با افزایش سابقه کار، میانگین شاپرستگی مراقبت‌های اختصاصی ۳/۸۸ افزایش یافت که این افزایش معنی‌دار بود ($p < 0.05$).

همچنین مشخص شد شاپرستگی بالینی در سه حیطه اخلاقی - عاطفی، ارتباط درمانی و مراقبت‌های ویژه با متغیرهای جنسیت، وضعیت تأهل، تعداد فرزندان،

پرستاران در سطح متوسط و تنها ۰/۹ درصد از پرستاران در این بعد در سطح ضعیف قرار داشتند (جدول ۲). در بررسی ارتباط مشخصات دموگرافیک با هر یک از ابعاد اخلاقی - عاطفی، ارتباط درمانی و مراقبت‌های ویژه شاپرستگی بالینی از مدل‌های آماری رگرسیون چند جمله‌ای استفاده شد. در این روش برای هر متغیر در حالی که روی بقیه تعديل شده است، ارتباط با متغیر پاسخ بررسی شد. برای تک تک ضرایب متغیرهای آزمون برابری با صفر انجام شد و در صورتی که برای صفر بودند، به این معنی بود که آن متغیر در متغیر پاسخ تأثیری نداشت و ارتباط بین این دو معنی‌دار نبود. عرض از مبدا یکی از پارامترهای برآورده شده در رگرسیون بود که برای برآورده پارامتر اصلی استفاده شد. برای آزمون مستقل بودن باقی مانده‌ها در رگرسیون از آزمون دوربین واتسون استفاده شد. آماره دوربین واتسون اگر بین ۱ تا ۳ بود مجاز به استفاده از روش رگرسیون بودیم. مقدار به دست آمده از آزمون دوربین واتسون که مقدار ۱/۷۰ و مطلوب بود. مفروضات مورد نیاز رگرسیون خطی بررسی شد و برقرار بود.

در بررسی ارتباط مشخصات دموگرافیک با بعد اخلاقی - عاطفی شاپرستگی نتایج نشان داد با افزایش هر ۱۰ ساعت

جدول ۲. توزیع فراوانی و میانگین و انحراف معیار حیطه‌های شایستگی بالینی در پرستاران

حیطه‌های شایستگی بالینی	فراوانی	درصد	میانگین	انحراف معیار
شایستگی بالینی کل	۴۵>	۲/۳	۵	
متوسط	۴۶-۹۰	۱۱/۹	۲۵	
خوب	۹۱-۱۳۵	۷۰/۹	۱۴۹	
عالی	۱۳۶-۱۸۰	۱۴/۷	۳۱	
اخلاقی عاطفی	۱۲>	۶/۴۸ ±	۱/۴	ضعیف
متوسط	۱۳-۲۴	۱۴/۳	۳۰	
خوب	۲۵-۳۶	۶۲/۸	۱۳۲	
عالی	۳۷-۴۸	۲۱/۴	۴۵	
ارتباط درمانی	۱۰>	۵/۹۴ ±	۳/۸	ضعیف
متوسط	۱۱-۲۰	۳۰/۹	۶۵	
خوب	۲۱-۳۰	۵۲/۳	۱۱۰	
عالی	۳۱-۴۰	۱۲/۸	۲۷	
مراقبت‌های ویژه	۲۳>	۱۱/۳۰ ±	۰/۹	ضعیف
متوسط	۲۴-۴۶	۹/۵	۲۰	
خوب	۴۷-۶۹	۷۱/۴	۱۵۰	
عالی	۷۰-۹۲	۱۸/۱	۳۸	

جدول ۳. رابطه متغیرهای دموگرافیک پرستاران با میزان شایستگی بالینی آنها

متغیرها / طبقات	ضریب	خطای استاندارد	آماره	سطح معناداری
عرض از مبدأ	-	-	-	-
اضافه کار	+/+/+	+/-/+	+/-/+	+/-/+
سابقه کار	+/-/+	+/-/+	+/-/+	+/-/+
تعداد قریب‌دان	+/-/+	+/-/+	+/-/+	+/-/+
تحصیلات	+/-/+	+/-/+	+/-/+	+/-/+
جنسيت	-	-	-	-
مرد	-	-	-	-
وسعیت تا هل متاهل	-/-/+	-/-/+	-/-/+	-/-/+
مجرد	-	-	-	-
شیفت کاری صبح	+/-/+	+/-/+	+/-/+	+/-/+
عصر	+/-/+	+/-/+	+/-/+	+/-/+
شب	+/-/+	+/-/+	+/-/+	+/-/+
دوشیقی	-	-	-	-
چرخشی	-	-	-	-

بالینی، تغییرات از نظر آماری معنی‌دار نبود ($p > 0.05$)
(جدول ۳).

تحصیلات و شیفت کاری ارتباط معنی‌داری نداشت. یعنی با وجود تاثیر این متغیرها در میانگین امتیازات شایستگی

بحث

ضروری است که پرستاران مهارت خود را در این زمینه افزایش دهند. وظیفه یک پرستار برآورده ساختن نیازهای بیمار از طریق ارتباط موثر است (۲۴). ضعف در برقراری ارتباط سبب عدم برقراری رابطه مناسب با بیمار شده و موجب بروز اعمال خشونت بار نسبت به پرستار می‌شود (۲۵). در همین راستا، مطالعه قلجه و همکارانش در حیطه شایستگی ارتباطی نشان داد که $72/3$ درصد پرستاران در حد انتظار قرار داشتند و در حیطه مهارت حرفه‌ای $76/6$ درصد پرستاران در حد انتظار قرار داشتند (۶) که با مطالعه حاضر همخوانی دارد. در مطالعه حاضر بین متغیرهای سابقه کار، اضافه کار و نوبت کاری با شایستگی بالینی واحدهای پژوهش رابطه معنی‌داری وجود داشت. بدین صورت که پرستارانی که در نوبت کاری صبح فعالیت داشتند، به طور معناداری شایستگی بالینی بیشتری در حیطه‌های اخلاقی عاطفی و ارتباط درمانی نسبت به پرستاران شاغل در نوبت کاری چرخش داشتند. در مطالعه جلالی نیز شایستگی بالینی پرستاران با نوبت کاری رابطه معنی‌دار داشت، به طوری که میانگین شایستگی بالینی پرستاران صبح کار $162/75$ و پرستاران شیفت در چرخش $127/46$ گزارش شد (۲۶). این مطالعه با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد.

نتایج بدست آمده از مطالعه ما بیانگر این است با افزایش ساعت اضافه کار، میانگین شایستگی اخلاقی/ عاطفی کاهش معنی‌داری می‌یابد. با توجه به آنکه ساعت طولانی کار می‌تواند سلامت و امنیت فرد را به مخاطره اندازد، باعث کاهش هوشیاری، شایستگی و کاهش بهره وری در شغل نیز می‌شود (۲۷). طبق مطالعه فرزیان پور و همکارانش در سال 2016 ، اجتناب از اضافه کاری در پرستاران می‌تواند از عوارض شدید نوبت کاری پیشگیری کرده و سطح سلامت و در نهایت کیفیت مراقبت را ارتقا دهد (۲۸).

طبق یافته‌های مطالعه حاضر، با افزایش سابقه کار بالینی پرستاران، میزان شایستگی بالینی در ابعاد ارتباط درمانی و مراقبت‌های ویژه افزایش می‌یابد. با توجه به اهمیت تجربه بالینی در بخش‌های اعصاب و روان می‌توان بر لزوم توجه به به کارگیری افراد با تجربه کاری لازم در این بخش‌ها تاکید کرد؛ چرا که کار در بخش‌های اعصاب و روان با موقعیت‌های بالینی خاص، نیازمند افراد با تجربه کافی است. مطالعه تبری خمیران نیز موکد این موضوع است که تجربه کافی با به کارگیری دانش تئوری یکی از عوامل موثری است که در فرایند کسب شایستگی‌ها در پرستاری حائز اهمیت است (۲۹). طبق مطالعه کیم، شایستگی بالینی پرستاران متاهل و دارای سابقه بیشتر،

در این پژوهش شایستگی بالینی پرستاران شاغل در بخش‌های اعصاب و روان بیمارستان منتخب دانشگاه علوم بهزیستی و توابع‌خواهی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج مطالعه نشان داد میزان کلی شایستگی بالینی واحدهای پژوهش در سطح خوبی است. پرستاران به عنوان بخشی از منابع انسانی نظام سلامت در ارتقای سلامت افراد جامعه نقش مهمی ایفا می‌کنند. تربیت پرستاران باید به طریقی انجام پذیرد که با تغییرات نیاز جامعه، دانش جدید و یافته‌های نوین مربوط به نحوه ارائه خدمات سلامت از هماهنگی لازم برخوردار باشد تا از این طریق بتوانند به طور کامل توانمندی و مهارت و شایستگی شغلی خود را نشان دهند (۲۱).

در پژوهش قلجه و همکارانش در سال 2008 که به بررسی شایستگی بالینی پرستاران در تمام بخش‌های بیمارستان پرداختند، اکثریت پرستاران (82 درصد) شایستگی بالینی در حد انتظار و یا بیشتر از حد انتظار داشتند، اما از آنجا که وظایف پرستار بسیار حساس و مهم است و ارتباط نزدیکی با سلامتی و حیات مددجویان وجود دارد؛ لذا وجود $17/1$ درصد پرستاران با شایستگی کم قابل توجه است (۶). در مطالعه‌ای که توسط چنگ و همکارانش در سال 2014 انجام شد، نتایج سطح بالایی از شایستگی بالینی را در پرستاران نشان دادند (۷). مطالعه مهدوی صائب و همکارانش در سال 2016 نشان داد، شایستگی بالینی پرستاران هم در روش خودارزیابی و هم به روش ارزیابی توسط سرپرستاران در اکثر حیطه‌ها عالی است (۲۲). در مطالعه حاجی باقری، شایستگی بالینی پرستاران از دیدگاه پرستاران با میانگین $78/24$ در سطح خوب و توسط سرپرستاران با میانگین $78/08$ در سطح عالی بیان شد (۱۶). نتایج به دست آمده از مطالعات فوق الذکر همراستا با نتایج مطالعه حاضر است.

در ارتباط با حیطه شایستگی اخلاقی - عاطفی نتایج نشان داد $62/8$ درصد پرستاران تحت مطالعه در سطح خوب بودند. رعایت موازین اخلاقی و داشتن وجودن کاری سبب مسئولیت پذیری و به کارگیری دانش و مهارت برای مراقبت از بیمار می‌شود و در شایستگی بالینی مؤثر است (۲۳). در مطالعه حاضر در حیطه شایستگی ارتباط درمانی $52/3$ درصد پرستاران تحت مطالعه در سطح خوب قرار داشتند و در حیطه شایستگی مراقبت‌های ویژه نتایج نشان داد $21/4$ درصد پرستاران در سطح خوب بودند. با توجه به اینکه توانایی ارتباطات یک مهارت کلیدی برای پرستاران روانپژوهشی است

مدیران پرستاری از سطح شایستگی بالینی پرستاران شاغل در بخش‌های اعصاب و روان در جهت سطح بندی پرستاران بر اساس میزان شایستگی بالینی و با هدف توزیع مناسب‌تر آنها در بخش‌های مختلف استفاده نمایند.

از محدودیت‌های مطالعه حاضر، استفاده از روش مشاهده مستقیم است که می‌تواند رفتار پرستاران را تحت تأثیر قرار دهد که از کنترل پژوهشگر خارج بود. محدودیت دیگر مربوط به کمبود مطالعات مشابه در خصوص شایستگی بالینی روانپرستاران در ایران و سایر کشورها بود. همچنین پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آتی، شایستگی بالینی روان پرستاران توسط مشاهده، خودارزیابی و ارزیابی توسط مدیران پرستاری با یکدیگر مقایسه شود.

تقدیر و تشکر

بدين وسیله از تمامی پرستاران شرکت کننده در این مطالعه که با محققان همکاری کردند سپاسگزاری می‌شود. این مطالعه حاصل پایان نامه دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد رشته روان پرستاری است. بدين وسیله از حمایت‌های مسئولین دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در انجام مطالعه تقدیر می‌شود.

بالاتر از سایر پرستاران بود (۳۰). در مطالعه که توسط فلینکمن و همکارانش صورت گرفت نشان داد شایستگی بالینی پرستاران با افزایش تجربه کاری، سن و تحصیلات ارتباط مستقیمی دارد (۳۱). این مطالعات با نتایج مطالعه حاضر همراستا است. این در حالی است که طبق مطالعات وثوقی و همکارانش و ادیب حاجی باقری و اشراقی، بین شایستگی بالینی پرستاران با متغیرهای وضعیت تأهل، تحصیلات، نوع استخدام و سابقه کار ارتباطی گزارش نشد (۱۵, ۱۶). در نتایج مطالعه بحریتی نیز رابطه معنی‌داری بین سن، سابقه کار کلی و سابقه کار در بخش فلی پرستاران با میانگین شایستگی بالینی آنها وجود نداشت. طبق یافته‌های پژوهشگران احتمالاً پایین بودن دستمزده، فرسودگی شغلی ناشی از کار سنگین و زیاد و نارضایتی شغلی موجود در بین پرستاران می‌تواند باعث شود که برخی از پرستاران همراه با افزایش سن و سابقه کار دچار فرسودگی و نارضایتی بیشتری شده و این نارضایتی را در ارزیابی‌های خود به نمایش بگذارند (۳۲). در مجموع به نظر می‌رسد که شایستگی بالینی پرستاران یک متغیر چند عاملی است و فرآیند کسب شایستگی بالینی بر اساس رابطه بین سه عامل مهم اخلاق، تجربه کاری مفید و عوامل محیطی حاصل می‌شود (۳۳).

نتایج این ارزیابی‌ها می‌تواند در سنجش نیازهای آموزشی پرستاران روان پزشکی کمک کننده باشد و همچنین آگاهی

REFERENCES

1. Komeili Sani H, Etemadi A, Bostani H, Bahraini M, Hakim A. The relationship between clinical competency and nurses' job stress in hospitals affiliated to Ahwaz University of Medical Sciences in 2013. Journal of Nursing and Midwifery. 2014; 40: 41-6. [In Persian]
- 2 - Nilsson J, Johansson E, Egmar AC, Florin J, Leksell J, Lepp M, et al. Development and validation of a new tool measuring nurses self-reported professional competence—The nurse professional competence (NPC) Scale. Nurse 2014;34:574-80.
- 3- Mohtashami J, Pazargadi M, Salsali M, Manoochehri H, Alavi Majd H. Developing Mental Health Nursing Students' Clinical Competency Model. International Journal of Physical and Social Sciences. 2014; 4: 261-263. [In Persian]
- 4- Bagheri Nesami M, Rafiei F, Parvizi S, Esmaeili R. Nursing competency concept analysis: Qualitative research and presentation of a hybrid model. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2008;18::35-49. [In Persian]
- 5- Lyngfoss B, Bjørk IT. Self-evaluation of competence by nurses working offshore. Norwegian J Clin Nurs 2017; 11:12-22.
- 6- GHelje M, GHeljaee F, Mazlom A. Correlation between nurse's clinical competence and patient satisfaction with nursing. Journal of Shahid Beheshti School of Nursing and Midwifery 2008;18:12-9. [In Persian]
- 7- Cheng CY, Tsai HM, Chang CH, Liou SR. New graduate nurses' clinical competence, clinical stress, and intention to leave: a longitudinal study in Taiwan. Sci World J 2014;20:14-19.
- 8- Coventry TH, Maslin-Prothero S, Smith G. Organizational impact of nurse supply and workload on nurses continuing professional development opportunities: an integrative review. J Adv Nurs 2015;71:2715-27.
- 9- Casey M, Cooney A, O'Connell R, Hegarty JM, Brady AM, O'Reilly P, et al. Nurses', midwives' and key stakeholders' experiences and perceptions on requirements to demonstrate the maintenance of professional competence. J Adv Nurs 2017;73:653-64.
- 10- Lakanmaa RL, Suominen T, Perttilä J, Ritmala-Castrén M, Vahlberg T, Leino-Kilpi H. Basic competence in intensive and critical care nursing: development and psychometric testing of a competence scale. J Clin Nurs 2014;23:799-810.

- 11- Numminen O, Laine T, Isoaho H, Hupli M, Leino-Kilpi H, Meretoja R. Do educational outcomes correspond with the requirements of nursing practice: educators' and managers' assessments of novice nurses' professional competence? *Scand J Caring Sci* 2014;28:812-21.
- 12- Bahreini M, Moattari M, Kaveh MH, Ahmadi F. A comparison of nurses' clinical competences in two hospitals affiliated to Shiraz and Boushehr Universities of Medical Sciences: A Self-Assessment. *Iran J Med Sci* 2010;10:101-10. [In Persian]
- 13- Kavanagh JM, Szweda C. A crisis in competency: The strategic and ethical imperative to assessing new graduate nurses' clinical reasoning. *Nursing Education Perspectives* 2017;38:57-62.
- 14- Sargazi O, Foroughameri G, Miri S, Farokhzadian J. Improving the professional competency of psychiatric nurses: Results of a stress inoculation training program. *Psychiatr Res* 2018;270:682-7.
- 15- Namadi-Vosoughi M, Tazakkori Z, Habibi A, Abotalebi-Daryasari G, Kazemzadeh R. Assessing Nursing Graduates' Clinical Competency from the Viewpoints of Graduates and Head Nurses. *Journal of Health and care* 2014;16:66-73. [In Persian]
- 16- Adib Hajbaghery M, Eshraghi Arani N. Assessing nurses' clinical competence from their own viewpoint and the viewpoint of head nurses: a descriptive study. *Iran Journal of Nursing*. 2018;31:52-64. [In Persian]
- 17- AliZadeh S, Mokhtari Nouri J, Taqwa A, Azizi M. Effect of implementation of evidence-based nursing care guidelines on the standard of quality of care in the psychiatric ward. *Journal of Military Sciences* 2016; 3: 123-132. [In Persian]
- 18- Sadeghi S, Dasht Bozorgi B, Latifi M. Comparison of mental health and marital satisfaction of nurses working in psychiatric and other departments of teaching hospitals of Jondishapoor, Ahwaz, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran. *Nursing and Midwifery Clinical Journal* 2016;6: 53-65. [In Persian]
- 19- Vaghee S, Meshkin Yazd A, Asgharipour N, Ebrahimzadeh S. The effect of critical thinking training on nurses' job stress in psychiatric ward. *Journal of Fundamentals of Mental Health* 2014; 16: 12-21. [In Persian]
- 20- Dean AJ, Gibbon P, McDermott BT, Davidson T. Exposure to aggression and the impact on staff in a child and adolescent inpatient unit. *Arch Psychiatr Nurs* 2010; 24: 15-26.
- 21- Memarian R, Salsali M, Vaaki Z, Ahmadi F, Hajizade A. Effective factors in the process of achieving clinical competency. *Scientific Journal of Zanjan University of Medical Sciences* 2007;14:40-9. [In Persian]
- 22- Mahdavi Saeb F, Hanifi N, Kamali K. A comparative study of clinical competency of nurses in intensive care units by self-assessment and evaluation by head nurses of Zanjan University of Medical Sciences. *Nursing and Midwifery Preventive Care Magazine* 2016;6: 72-82. [In Persian]
- 23- Parsa Yekta, Z, Ramezani Badr F, Khatoni A. Nursing students' views about clinical competency and achievement rate. *Iranian Journal of Nursing Research* 2006; 1: 7-14. [In Persian]
- 24- Moskoei S, Mohtashami J, Ghalenoei M, Nasiri M, Tafreshi MZ. Development and psychometric properties rating scale of "clinical competency evaluation in mental health nurses": Exploratory factor analysis. *Electr Phys* 2017;9:4155.
- 25- Jahani M. Survey the level of violence incidence against nurses from their viewpoint and related factors in educational medical centers in Rasht in 2012 [MSc Thesis]. Rasht: Guilan University of Medical Sciences; 2012. [In Persian]
- 26- Jalali A, Kazemi S, Khatooni A, Rezaei M. Evaluation of clinical competency of nurses in career specially in hospitals affiliated to Kermanshah Medical Sciences University. *Quarterly Journal of Clinical Care Research*. 2015; 3: 10-16. ([In Persian]
- 27- Machi MS, Staum M, Callaway CW, Moore C, Jeong K, Suyama J, et al. The relationship between shift work, sleep, and cognition in career emergency physicians. *Acad Emerg Med* 2012; 19: 85-91.
- 28- Farzianpour F, Ansari Nosrati S, Rahimi Froshani A. Survey of relationship between nurses shift and personality characteristics in private hospitals in Tehran City. *Journal of Paramedical Sciences*, Tehran University of Medical Sciences 2016; 10: 419-428. [In Persian]
- 29- Khomeiran RT, Yekta Z, Kiger A, Ahmadi F. Professional competence: factors described by nurses as influencing their development. *International Nursing Review* 2006;53:66-72. [In Persian]
- 30- Kim MJ, Kim YJ. Variables affecting nursing competency of clinical nurses. *Indian J Sci Technol* 2015;8:1-9.
- 31- Flinkman M, Leino-Kilpi H, Numminen O, Jeon Y, Kuokkanen L, Meretoja R. Nurse Competence Scale: a systematic and psychometric review. *J Adv Nurs* 2017;73:1035-50.
- 32- Bahreini M, Moattari M, Kaveh MH, Ahmadi F. Self-assessment of the clinical competence of nurses in a major educational hospital of Shiraz University of Medical Sciences. *Journal of Jahrom University Medical Sciences* 2010; 8: 28-36. [In Persian]